

## INSTRUCȚIUNE

### Vaccinarea împotriva COVID-19 în situații speciale

**Art. 1.** În conformitate cu RCP-ul fiecărui tip de vaccin, intervalul maxim între doza 1 și doza a-2-a este:

- până la 35 de zile pentru vaccinul Moderna
- până la 42 de zile pentru vaccinul Pfizer BioNTech
- până la 12 săptămâni pentru COVID-19 Vaccine AstraZeneca

**Art. 2.** Devansarea dozei a-2-a este permisă doar pentru următoarele vaccinuri:

- pentru vaccinul Pfizer BioNTech: administrarea dozei a-2-a la minim 19 zile după administrarea dozei 1
- pentru COVID-19 Vaccine AstraZeneca: administrarea dozei a-2-a la minim 28 de zile după administrarea dozei 1

**Art. 3.** Vaccinarea împotriva COVID-19 a persoanelor care au antecedente de infecție cu SARS CoV-2 nu este contraindicată; în aceste situații vaccinarea poate fi inițiată după vindecare.

**Art. 4.** În cazul în care o persoană dezvoltă infecție cu SARS CoV-2 după administrarea dozei 1 de vaccin împotriva COVID – 19 aceasta va putea fi vaccinată după vindecare prin continuarea schemei inițiale de vaccinare cu același produs, adică se va administra doar doza a-2-a.

**Art. 5.** În cadrul schemei de vaccinare împotriva COVID-19 nu este permisă combinarea diferitelor tipuri de vaccin cu excepția situației menționate la Art. 6.

**Art. 6.** Persoana care prezintă reacție anafilactoidă după administrarea primei doze de vaccin împotriva COVID-19 nu va mai primi a doua doză a aceluiași tip de vaccin; în aceste situații se recomandă efectuarea dozei a-2-a utilizând un alt vaccin împotriva COVID-19 fabricat după o tehnologie diferită, la cel puțin 4-8 săptămâni.